

基隆市衛生局 函

地址：基隆市信義區信二路266號
承辦人：莊小姐
電話：02-24230181 分機1408
電子信箱：vicky01@mail.klcg.gov.tw

202
(掛號)基隆市中正區信四路11號六樓

受文者：基隆市醫師公會

發文日期：中華民國113年11月18日

發文字號：基衛疾貳字第1130112416號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明段二

主旨：為加強病毒性肝炎防治，財團法人兒童肝膽疾病防治基金會編製「預防肝炎，從小做起」衛教單張，請貴單位(會)惠予轉知所屬(會員)可洽該會免費索取，請查照。


說明：

- 一、依據衛生福利部疾病管制署113年11月14日疾管防字第1130012532A號函、財團法人兒童肝膽疾病防治基金會113年11月11日(113)兒童肝膽醫字第1131111號函(如附件1)辦理。
- 二、旨揭衛教單張適用對象為孕產婦或家中有嬰幼兒或兒童者，檢附旨揭衛教單張影本(如附件2)供參，請貴單位(會)惠予轉知所屬(會員)，可視需求逕洽詢該基金會李秘書索取，聯絡電話：02-2382-0886分機11。

正本：新昆明醫院、醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院、長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院、衛生福利部基隆醫院、基隆市立醫院門診部、維德醫療社團法人基隆維德醫院、暘基醫院、南光神經精神科醫院、三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處、基隆市醫師公會

副本：基隆市中正區衛生所、基隆市七堵區衛生所、基隆市暖暖區衛生所、基隆市仁愛區衛生所、基隆市中山區衛生所、基隆市安樂區衛生所、基隆市信義區衛生所(以上均含附件)、本局疾病管制科

局長張賢政



兒童A型肝炎防護

- ♥ A型肝炎疫苗為最有效的預防措施，A型肝炎疫苗安全性很高，接種1劑疫苗後，約有95%以上的個體可產生保護抗體，而按時完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上。
- ♥ A型肝炎疫苗自107年起納入幼兒常規接種，提供106年(含)以後出生幼兒出生滿12-15個月接種第1劑，間隔6個月以上接種第2劑。114年1月起調整接種時程於出生滿18個月、27個月分別接種第1、2劑，兩劑間隔至少6-12個月。
- ♥ 自108年4月8日起，公費A型肝炎疫苗接種擴及國小六年級(含)以下之低收及中低收入戶兒童。
- ♥ 國內青少年未接種疫苗者幾乎都未具A型肝炎抗體，因此潛藏A型肝炎爆發流行之風險，針對未具A型肝炎抗體保護的人及高風險族群，建議自費接種2劑A型肝炎疫苗。



認識兒童C型肝炎

- ♥ C型肝炎主要是經由血液透過皮膚或黏膜進入體內而傳染，目前並無疫苗可預防。兒童感染C型肝炎可能的途徑包括①母嬰傳染：C型肝炎孕婦傳染給寶寶；②長期接受血液製劑或洗腎(血液透析)；③靜脈注射藥癮者；④接觸污染的針頭或器具(如牙刷、指甲剪等)；⑤其他如癌症病患、血友病患者及各種因手術必須輸血者。
- ♥ 許多人並不瞭解自己是有無感染C型肝炎，且感染後不一定會有症狀出現，因此需要靠抽血檢查做正確的診斷。
- ♥ 當血液中C型肝炎抗體(anti-HCV)呈現陽性，應檢測C型肝炎病毒RNA，若為陽性表示有C型肝炎病毒感染，請洽詢醫師並配合後續追蹤治療。中央健康保險署自106年1月24日起已給付新型的全口服抗病毒藥物，依據臨床經驗顯示，若遵從醫師指示按時服藥及定期就醫，治癒率可達9成7以上，且療程短，約8~16週，副作用低，也有12歲(含)以上兒童患者的給付藥物選擇。



預防肝炎， 從小做起！




『兒童肝炎衛教防疫』2步驟：

1. 114年1月起，幼童常規A型肝炎疫苗調整於出生滿18個月、27個月分別接種第1、2劑；出生24小時內儘速接種第1劑B型肝炎疫苗，於出生滿1個月及6個月時依序完成第2劑及第3劑疫苗接種。
2. B型肝炎表面抗原(HBsAg)陽性母親所生之寶寶，除依時程完成3劑B型肝炎疫苗接種外，於出生24小時內應儘速注射一劑B型肝炎免疫球蛋白。另孩子滿12個月大時，應接受B型肝炎血液篩檢，了解是否已感染或未產生抗體。如經檢測未產生B型肝炎表面抗體，亦未成為B型肝炎帶原者，可再追加接種公費疫苗提升抗體產生機率。

指導單位：衛生福利部疾病管制署


諮詢單位：財團法人兒童肝膽疾病防治基金會

基金會諮詢電話：(02) 2382-0886




B型肝炎與準媽媽

- ♥ B型肝炎帶原可能損傷肝臟和提高罹患肝硬化或肝癌的機率。
- ♥ B型肝炎病毒可以由帶原媽媽在懷孕生產過程中傳染給寶寶；也稱做「母嬰傳染」。
- ♥ B型肝炎病毒除了母嬰傳染之外，還可透過沒有防護的性行為或接觸到受感染者的血液而感染，例如：共用牙刷、刮鬍刀、刺青工具或者其他會接觸到血液或體液的針頭和器具。



向妳的婦產科醫生 詢問B型肝炎驗血結果


- ♥ 慢性B型肝炎通常沒有任何症狀，身為一位準媽媽，在懷孕9週後或第二次產檢時應該檢查B型肝炎，請媽媽仔細查看這項驗血結果：
 - ★ B型肝炎表面抗原 (HBsAg)：如果表面抗原的檢查為陽性，那麼您就是B型肝炎帶原者。
 - ★ B型肝炎e抗原 (HBeAg)：如果e抗原檢查為陽性，那麼表示您現在體內B型肝炎病毒正處於高病毒量，具有高傳染性。
 - ★ 如果您的B型肝炎表面抗原 (HBsAg) 檢查為陽性，請醫師協助於第二孕期（懷孕第13至29週）轉介至消化專科進行B肝病毒量檢測及評估是否符合健保抗病毒藥物治療給付對象，並配合治療，以再降低新生兒感染B型肝炎的機率。



保護自己和你的寶寶

- ♥ 因母嬰傳染而得到B型肝炎的新生兒，有大於90%的機率成為B型肝炎的終身帶原者，增加了日後罹患慢性肝病或肝癌的機率。還好，B型肝炎是有疫苗可以預防的喔！
- ♥ 民國75年7月起，政府全面實施新生兒B型肝炎預防接種計畫，大大地阻絕寶寶受到B型肝炎的威脅，當然也減低了寶寶日後可能罹患肝硬化或肝癌的風險。
- ♥ B型肝炎帶原媽媽的新生兒寶寶，除了按時程注射3劑B型肝炎疫苗外，在出生24小時內都應儘速再注射1劑免費的B型肝炎免疫球蛋白 (HBIG)。
- ♥ 建議B型肝炎帶原媽媽後續應每6~12個月追蹤一次肝功能及腹部超音波檢查，如肝功能異常，則由醫師評估治療及追蹤頻率。

注射B肝疫苗後仍有 可能感染B肝病毒！



- ♥ 研究顯示，表面抗原及e抗原陽性的媽媽，其新生兒完成B型肝炎免疫球蛋白 (HBIG) 以及3劑的B型肝炎疫苗，可預防90%的母嬰傳染；然而，有部分的寶寶在接受HBIG及完整的疫苗注射之後仍可能感染了B型肝炎病毒或未產生保護抗體。
- ♥ 如果媽媽的表面抗原陽性，請在寶寶滿12個月大時，帶他前往醫院抽血檢驗以瞭解預防接種成效與帶原情形，若無B肝抗體且未被感染，請及早採取疫苗追加接種，並依醫囑進行後續追蹤檢查。

疫苗種類	疫苗名稱	接種時間
出生24小時內儘速接種(越早越好)	B型肝炎免疫球蛋白 (HBIG)	✓
	第一劑 B型肝炎疫苗	✓
出生滿1個月	第二劑 B型肝炎疫苗	✓
出生滿6個月	第三劑 B型肝炎疫苗	✓
出生12個月大時	驗血檢查寶寶的B型肝炎表面抗原 (HBsAg) 和B型肝炎表面抗體 (anti-HBs) (註)	✓

註：

- ♥ 媽媽若為B型肝炎表面抗原 (HBsAg) 陽性者，寶寶在滿12個月大時，應抽血檢驗B型肝炎表面抗原及抗體。
- ♥ 幼兒經檢測如B型肝炎表面抗體 (anti-HBs) 陽性者：代表已有保護力。
- ♥ 幼兒經檢測為B型肝炎帶原者：如其肝功能正常，原則建議每6-12個月追蹤一次；如肝功能異常，則由醫師決定其肝功能及超音波複檢時間。
- ♥ 如經檢測未產生B型肝炎表面抗體亦未成為B型肝炎帶原者：可免費追加一劑B型肝炎疫苗，1個月後再抽血檢驗，若表面抗體仍為陰性 (<10 mIU/ml)，後續可於1、6個月時接續完成第2、3劑公費疫苗接種。如經此補種仍無法產生抗體者，則無需再接種；但仍應採取B型肝炎相關預防措施，並定期追蹤B型肝炎表面抗原 (HBsAg) 之變化。